



در طول دوره درمان به محض مشاهده علایمی از این قبیل به پزشک خود اطلاع دهد:

◀ زردی پوست و کره ی چشم ها (یرقان)

◀ درد قسمت بالا و سمت راست شکمتان

◀ تورم شکم

◀ تهوع استفراغ

◀ ضعف عمومی بدن (کرختی)

◀ گیجی و سردرگمی و خواب آلودگی و خستگی

◀ کاهش ادرار

◀ درد یا فشار در قفسه سینه

◀ تورم در پاها یا مچ پا

◀ تشدید تنگی نفس

در صورتیکه داروی دیگری مصرف می کنید،  
حتمادر این مورد با پزشک خود مشورت کنید.

اگر عوارض ایجاد شده، شدید باشد، داروی مناسب جهت درمان عوارض نیز تجویز گردد.

افزایش گلوکز سرم، افزایش تستهای کبدی، نارسایی کلیوی حاد و کاهش GFR و تب از عوارض دیگر این دارو می باشد که پزشک با توجه به نتایج آزمایشاتی که روز درمیان برای سنجش عملکرد کبد و کلیه انجام می دهد، تصمیم به ادامه درمان یا قطع دارو خواهد گرفت.

## آموزش به بیمار:

با توجه به اینکه تزریق رمدسیویر می تواند باعث عوارضی حین تزریق شود، در صورت هرگونه تغییر در ضربان قلب، تب، تنگی نفس، ویزینگ (تنفس صدا دار)، تورم لبها، تورم صورت یا گلو، ایجاد راش (لکه های پوستی قرمز رنگ)، تهوع، تعریق یا لرز به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید .



## رمدسیویر

مرکز آموزشی درمانی آیت الکاظمی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار 9-32264825-038

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار 1403

کد: PE/IN -KH-01-18

## تستهای آزمایشگاهی قبل از تزریق دارو

### رمدسیویر:

1. تست هماتولوژی
2. تست عملکرد کبد
3. تست عملکرد کلیه
4. تست بیوشیمیایی سرم

براساس نتایج این آزمایشات و نتیجه آزمایش کرونا PCR و نتایج سی تی اسکن ریه، پزشک تصمیم به شروع تزریق رمدسیویر می‌گیرد.

### دوره درمان با رمدسیویر:

کل دوره درمان ۵ روز می‌باشد.  
این دارو با ۲۵۰ سی سی سرم سدیم کلراید ۰.۹٪ رقیق شده و تزریق می‌گردد.  
مدت زمان تزریق بسته به تجویز پزشک ۳۰ تا ۱۲۰ دقیقه می‌باشد.

این دارو یک داروی ضد ویروس است که فقط در بیماران مبتلا به کرونا COVID19 بستری در بیمارستان، جایگاه درمانی دارد.

ضرورت مصرف این دارو در درمان کرونا بر اساس شرایط بیمار توسط پزشک معالج تعیین می‌شود، چرا که استفاده از آن در برخی فازهای بیماری کمک کننده نمی‌باشد.

این دارو در سطح بیمارستانها توزیع می‌گردد و تنها در اطفال و بزرگسالانی که مبتلا به کرونا در آنها تأیید شده و درگیری ریوی نیازمند حمایت تنفسی داشته باشند (در مراحل اولیه بیماری)، ممکن است کمک کننده باشد.

اگرچه اطلاعات محدودی در خصوص ایمنی و اثربخشی این دارو داریم اما مشخص شده است که این دارو منجر به کوتاه شدن طول دوره درمان در برخی از بیماران شده است به نحوی که بیماران بعد از تزریق نوبت سوم، در صورت پاسخ به درمان، بهبودی را احساس خواهند کرد.

هر چه مدت انفوزیون بیشتر باشد احتمال ایجاد واکنش‌های حساسیتی کمتر خواهد بود.

بیمار در هنگام انفوزیون بایستی توسط پرستار پایش شود.

تست‌های کبدی و کلیوی بایستی قبل شروع درمان و روزدرمیان چک گردد.

هیچ داروی تزریقی دیگری نباید همزمان و از یک رگ تزریق شود.

### عوارض رمدسیویر:

تعریق، افت فشارخون، تهوع، لرز و استفراغ در طول تزریق رمدسیویر مشاهده شده‌اند.

