



سپسیس

مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۲۵۴۸۲۵-۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/IN -KH-01-19

علائم شوک عبارتند از :

- رنگپریدگی
- ضربان تند ولی ضعیف
- تنفس تند ولی کم عمق
- سرگیجه و عدم هوشیاری
- فشار خون پایین

اهمیت درمان

سپسیس، میلیون ها نفر در سراسر جهان را درگیر میکند و از هر ۴ نفر، یک نفر جان خود را از دست می دهد.

سپسیس ممکن است تبدیل به شوک عفونی شود یا در صورتی که سریع درمان نشود به مرگ بیانجامد.

هرچه این بیماری به موقع تشخیص داده و درمان شود، احتمال زنده ماندن بیشتر است.

در صورتی که عالمی مانند شوک در فرد ایجاد شود، باید او را به بخش مراقبت های ویژه منتقل کرد.

✓ هنگام بروز سپسیس شدید، ممکن است حجم زیادی از مایعات وریدی به فرد تزریق شود و دستگاه اکسیژن برای تنفس استفاده شود.

✓ اگر کلیه ها دچار اختلال شوند، ممکن است به دیالیز نیاز باشد. کلیه ها مواد دفعی مضر، نمک و آب اضافی را از خون دفع میکنند. دستگاه دیالیز هم همین کارها را انجام میدهد.

✓ ممکن است گاهی برای برداشتن علت عفونت به جراحی نیاز باشد. این جراحی میتواند شامل برداشتن بافت عفونی یا تخلیه آبسه چرکی باشد.

سپسیس یک اورژانس پزشکی است و می

تواند باعث ایجاد شوک در فرد شود بنابراین

درمان آن باید در بیمارستان و یا حتی در بخش

مراقبت های ویژه انجام شود.

سپسیس چگونه درمان می شود ؟

- ✓ رساندن اکسیژن به بیمار
- ✓ شروع آنتی بیوتیک های وسیع الطیف (آنتی بیوتیک هایی که قوی باشند و بتوانند روی انواع بیشتری از باکتریها اثر گذار باشند)
- ✓ دارو برای افزایش فشار خون
- ✓ انسولین برای تنظیم قند خون
- ✓ کورتیکواستروئید برای کاهش التهاب
- ✓ مسکن برای کاهش درد
- ✓ تقویت سیستم ایمنی بدن بیمار یا دارو
- ✓ سرم درمانی (یا تجویز سرم از کاهش حجم مایعات بدن بیمار جلوگیری می شود)
- ✓ ویتامین ث بعنوان یکی از فاکتورهای پیشگیری کننده از بروز سپسیس شناخته شده که بدن باید از طریق غذایی که فرد می خورد، آن را جذب کند.

علائم بیماری سپسیس کدامند ؟

- ✚ تب مداوم یا متناوب همراه با لرز
 - ✚ افزایش ضربان قلب و تنفس
 - ✚ راشهای پوستی (خونریزی کوچک زیر پوستگی)
 - ✚ کاهش سطح هوشیاری و هذیان و گیجی
 - ✚ دردهای مفصلی (در موارد کمگرمات درد سگون مهرها ، مچ دست ، ران و آرنج)
- برخی از علائم بالا میتواند ناشی از آنفولنزا یا سایر بیماریها باشد.
- با این حال اگر در دوران نقاهت به سر می برید یا به تازگی عمل جراحی داشته اید ، بهتر است با مشاهده ی این علائم بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

چه افرادی در خطر ابتلا به سپسیس می باشند ؟

- افرادی که به هر دلیل سیستم ایمنی بدنشان ضعیف یا از کار افتاده است مثل بیماریهای ایدز ، سرطان و....
- افرادی که سیستم ایمنی آنها هنوز کامل نشده است مثل بچه های خردسال که دچار عفونتی می شوند ولی بطور کامل درمان نمی شوند
- افراد پیر و سالمند که یک بیماری طولانی و زمینه ای دارند مثل دیابت
- افرادی که دچار سوختگی های وسیع در بدن و اعضامیشوند .

