



تزریق آواستین

مرکز آموزشی درمانی آیت الکاظمی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۲۵۴۸۲۶-۳۲۲۶-۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/EYE -KH-01-03

شش ساعت بعد از تزریق بیمار میتواند

شستشوی صورت انجام دهد و منعی جهت

وضعو گرفتن واستحمام وجود ندارد، ولی حتی

الامکان از ورود آبیبه داخل چشم جلوگیری شود.

اثر داروی تزریق شده بلافاصله ظاهر نمی شود

بنابراین در صورت عدم افزایش بینایی بلافاصله

بعداز تزریق، نیاز به مراجعه نمی باشد.

محدودیت غذایی و فعالیتی خاصی وجود ندارد.

نیازی به قطع آسپرین و یا سایر داروها، قبل و

بعداز تزریق نمی باشد.



مراقبتهای بعد از تزریق آواستین

دو ساعت بعد از تزریق، پانسمان چشم باز شود

وبلافاصله ریختن قطره شروع گردیده و هر

۴ ساعت یک قطره (فقط در زمان بیداری) تا ۵

روز بعد ادامه یابد.

بعداز تزریق در صورت درد میتوان از داروهای

ضد درد مانند استامینوفون یا ژلوفن و استفاده

نمود.

در صورت افزایش درد، قرمزی جدید چشم و یعا

کاهش بینایی (نسبت به قبل از تزریق) فعورا بعه

نزدیک ترین متخصص چشم و یا اورژانس مراجعه

نمایید.

عوارض تزریق آواستین چیست؟

خوشبختانه بیمار با تزریق آواستین با عوارض خاصی مواجه نخواهد شد.

برخی از عوارض مانند درد جزئی در ناحیه تزری ، حقالقت تهوع، سردرد خفیف، ریزش اشک، قرمزی چشم، ایقجقاد خونریزی یا پارگی در شبکیه که به ندرت اتفاق می افتد میتواند مشاهده شود. در اکثر موارد عارضه قابل توجهی پیش نخواهد آمد.

افرادی که به بیماری های چشمی دچار هستند و پقرشقک تشخیص داده است که نیازمند تزری آواستین می باشند باید حتما طی مراجعات منظم تزری را انجام دهند تا چشم بیش از این درگیر نشود چرا که به راحتی کم شدن دید و در نهایت کوری حاصل خواهد شد. در این بین بیماران دیابتی باید اهمیت بیشتری به سالمقت چشم خود دهند زیرا بیش از سایر بیماران در معرض خطر قرار دارند .



بعد از تزریق آواستین


توجه: در صورت دیدن خونریزی در چشم

نحوه تزریق آواستین چگونه است؟

برای تزریق آواستین بیمار به اتاق عمل برده شده و پزشک متخصص چشم بدون انجام بیهوشی و تنها با ایجاد بی حسی عملیات مربوطه را به انجام خواهد رساند در نتیجه یک عمل سریایی و سریع خواهد بود که انتظار می رود، فرد طی مدت کوتاهی به فعالیت های روزانه خود بازگردد و دوران نقاهت بلندمدتی را سپری نکند.

این تزریق توسط یک سر سوزن بسیار نازک و ظریف صورت می گیرد و با توجه به تشخیص پزشک با ایجاد چند روز فاصله بین تزریق دو چشم برای چشم دیگر انجام شود.

پس از اتمام کار چشم یکی دوساعت پانسمان می شود.



آواستین یکی از دارو هایی که به شکل تزریق داخل چشمی در چند سال اخیر استفاده می شود. این دارو به چشم تزریق می شود تا به کاهش افت دید در این بیمار کمک کند.

در درمان بسیاری از بیماری های چشم مانند رتینوپاتی دیابتی ، انسداد وریدهای شبکیه ، ایجاد عروق خونی نابجا در مشیمیه و بسیاری دیگر از بیماری های شبکیه کاربرد دارد.

بسیاری از بیماری های ذکر شده مزمن و طولانی مدت هستند به همین دلیل دوره درمان آنها نیز طولانی است و در این مدت باید بطور متناوب هر چند وقت یکبار تزریق داخل چشم تکرار شود ، همچنین بیماران نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.

رتینوپاتی دیابتی عارضه چشمی ناشی از دیابت است که به دلیل تغییرات ایجاد شده در رگ های خونی رخ میدهد و میتواند باعث تخریب شبکیه شده و در نتیجه تصویری که شبکیه به مغز میفرستد را تار کند.

آمپول آواستین از ایجاد عروق جدید که در شبکیه چشم افراد دیابتی صورت میگیرد جلوگیری میکند. آواستین توسط جراح چشم پزشک در اتاق عمل و در شرایط خاصی در چشم بیمار تزریق میشود.