



برداشتن طحال

مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۳۲۲۶۴۸۲۵-۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار

کد: PE/SUR -KH-01-12

پیشگیری از عفونت بعد از طحال برداری

* تزریق و واکسن پنوموکوک و مننگوکوک ۵ سال بعد از جراحی و تزریق واکسن آنفلوانزای سالیانه
* تجویز پنی سیلین خوراکی حداقل ۲ سال بعد از عمل جراحی و ادامه مصرف براساس نظر پزشک
* تا حد امکان باید از سفر به مناطقی که احتمال ابتلا به بیماری مالاریا در آنجا وجود دارد اجتناب کنند.
* از مواجهه با افراد مبتلا به بیماریهای عفونی دوری کنند.

اقدامات مراقبتهای بعد از طحال

* مراقبت از زخم و تعویض پانسمان و شستشوی زخم
* از سر گرفتن فعالیت طبیعی بعد از ۲-۴ هفته
* توجه به علائم عفونت مثل تب ، ترشح چرکی از محل عمل
* مصرف صحیح آنتی بیوتیک های خوراکی طبق نظر پزشک
* خودداری از بلند کردن اشیاء سنگین و زور زدن و ورزشهای کششی و سنگین حداقل تا ۳ ماه
* جلوگیری از ایجاد یبوست با مصرف کافی آب و مایعات
* مطلع کردن پزشک مربوطه قبل از انجام هرگونه اقدام تهاجمی مانند جراحی و دندانپزشکی

* مهم ترین خطر مزمن طحال برداری کامل عفونت شدید و علائمی چون تب ناگهانی ، لرز ، استفراغ و سردرد دارد که بیشترین خطر در سالهای اول تا چهارم بعد از عمل جراحی بروز می کند.



اقدامات مراقبتی قبل از طحال برداری

* بهتر است طحال برداری بعد از سن ۵ سالگی انجام شود.
* حداقل دو هفته قبل از طحال برداری واکسن پلی والان پنوموکوک و مننگوکوک و اچ آنفلوانزا تزریق شود.
* قبل از طحال برداری باید سونوگرافی شکمی انجام شود و در صورتی که بیمار دارای سنگ کیسه صفرا باشد، کیسه صفرا نیز همزمان برداشته می شود.

عملکرد طحال

طحال یک عضو لوبیایی داخل شکمی است که به طور طبیعی در سمت چپ قسمت فوقانی شکم در کنار معده و بالای کلیه چپ قرار دارد. طحال در دوران مختلف زندگی وظایف کاملاً متفاوتی را برعهده دارد. در دوران جنینی تا ماه ششم جنینی طحال به عنوان یک مرکز خونساز عمل می کند و گلبول های قرمز و سفید خون و پلاکت را می سازد و پس از آن این فعالیت در طحال متوقف می شود و به مغز استخوان منتقل می شود. گاهی بعد از تولد، طحال عملکرد پاکسازی خون را بیش از حد لازم انجام می دهد و بسیاری از سلول های سالم را زایل می برد. این حالت که به بزرگ شدن طحال (هیپراسپلنیزم) نامیده می شود با برداشتن طحال بهبود می یابد که به دو صورت کامل و ناقص انجام می شود. در بیماران تالاسمی طحال علاوه بر جمع آوری گلبول های قرمز تخریب یافته جایگاه ذخیره آهن هم می باشد بنابراین اندازه طحال بیمار باید در طول درمان بررسی شود.

علائم بزرگی طحال

- * فرد به سرعت دچار خونریزی می شود.
- * احساس درد در قسمت بالا و سمت چپ شکم که ممکن است درد آن تا قسمت شانه همان سمت نیز احساس شود.
- * احساس سیری بدون اینکه غذا خورده باشید. گاهی اوقات هم با خوردن اندک ماده غذایی به فرد احساس سیری غیر عادی دست می دهد.
- * کم خونی
- * احساس خستگی
- * عفونت های مکرر
- * سکسکه
- * بی اشتها
- * تنگی نفس

تشخیص:

- * معاینه فیزیکی
- * آزمایش خون
- * تصویربرداری سونوگرافی یا اسکن توموگرافی کامپیوتری و MRI



دلایل طحال برداری در بیماران تالاسمی متوسط و شدید

- * افزایش میزان نیاز به خون
- * بزرگی طحال که باعث علائمی مانند درد قسمت فوقانی و چپ شکم با سیری زودرس همراه باشد.
- * لکوپنی شدید (کاهش مقدار گلبول های سفید از حالت طبیعی)
- * ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت ها به کمتر از ۱۵۰/۰۰۰)

عوارض طحال برداری

- * حاد: تب ، خونریزی
- * مزمن: عفونت و ایجاد لخته می باشد که در طحال برداری کامل رخ می دهد و در صورت ادامه افزایش میزان پلاکت باید قرص آسپیرین تا آخر عمر به صورت روزانه مصرف شود.