



2- برای کاهش خونریزی به مدت 4 تا 6 ساعت به پشت بخوابید.

3- علائم حیاتی شما کنترل می شود و به مدت 4 تا 6 ساعت بعد از عمل ناشتا باشید و پس از آن طبق دستور پزشک رژیم غذایی خود را با خوردن مایعات آغاز کنید.

4- برای بررسی مجدد از نظر خونریزی سونوگرافی کنترل انجام میشود و سپس مرخص می شوید.

5- تا دو هفته از بلند کردن اشیا سنگین و یا ورزش سنگین خودداری کنید.

در این موارد سریعاً به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه شود:

* خونریزی یا ترشحات از محل نمونه برداری

* تپش قلب و تب بالا

* درد شدید و سرگیجه

* احساس تنگی نفس

* تهوع و استفراغ مکرر

4- داروهای فشار خون خود را طبق روال عادی مصرف کنید.
5- در صورت دیابتی بودن، صبح روز عمل انسولین مصرف نکنید و در صورت داشتن هر گونه حساسیت پزشک را مطلع سازید.

6- قبل از انجام عمل، بدون مشورت پزشک مصرف هیچ کدام از داروهایتان و متوقف نکنید و یا مقدار آن را کاهش ندهید، پزشک دستورات خاصی در مورد زمان متوقف کردن و شروع مجدد داروها ارائه می کند.

آمادگی قبل از ورود به بخش اتاق عمل اینترونشنال:

1- پوشیدن لباس اتاق عمل و خارج کردن زیور آلات، دندان مصنوعی و عینک و سپس تحویل مدارک به اتاق عمل

2- در صورت احتیاج به سرویس بهداشتی، ابتدا این نیاز برطرف شود زیرا مدت نسبتاً طولانی نمیتوانید از تخت بلند شوید.

3- امضای فرم ضایع نامه آگاهانه توسط بیمار (در صورت عدم هوشیاری بیمار، توسط همراهی انجام شود)

اقدامات بعد از نمونه برداری یا بیوپسی پانکراس:

از هر 1000 بیمار تحت نمونه برداری پانکراس ممکن است 3 نفر دچار خونریزی بیشتری شوند که معمولاً در همان ساعات اولیه پس از انجام نمونه برداری رخ می دهد. به همین دلیل، لازم است:

1- به مدت 6 تا 8 ساعت استراحت مطلق باشید.



بیوپسی کبد

مرکز آموزشی درمانی آیت الکاظمی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۲۵۴۸۲۵-۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار

کد: PE/IN -KH-01-48

تتخیص نهایی برخی از بیماری های کبد تنها با انجام نمونه برداری از کبد ممکن است. همچنین، شدت آسیب و صدمه ناشی از بیماری تنها با بررسی نمونه کبد قطعی می شود.

روش نمونه برداری از کبد با هدایت سونوگرافی:


قبل از انجام درن گذاری از شما یک رگ محیطی از دستتان گرفته شده و به میزان لازم داروی آرام بخش به شما تزریق می گردد.

در زمان نمونه برداری از کبد، در حالی که شما به پشت و یا به پهلو چپ روی تخت خوابیده اید، از شما خواسته می شود دست راست را در روی سر قرار دهید. لباس ناحیه قفسه سینه سمت راست کنار زده می شود و پزشک محل دقیق انجام نمونه برداری از کبد را با استفاده از سونوگرافی مشخص و علامت می گذارد.

سپس با بتادین محل نمونه برداری ضدعفونی می شود. با یک سوزن نازک، ماده بیحس کننده موضعی داخل پوست شما در محل نمونه برداری تزریق می شود. ممکن است شما سوزش و ورود این سوزن را احساس کنید اما پس از آن، درد نخواهید داشت، اما کمی فشار هنگام انجام کار را احساس خواهید کرد.

پزشک محل ورود سوزن نمونه برداری را با یک تیغ ظریف باز میکند و سپس سوزن نمونه برداری با هدایت سونوگرافی از پوست به سمت کبد عبور داده می شود.

از شما خواسته می شود تا برای چند لحظه کوتاه نفس نکشید، در این زمان پزشک با کمک سوزن نمونه برداری ظرف چند ثانیه تکه کوچکی از کبد را به عنوان نمونه برمیدارد.



کبد چیست؟

کبد یکی از مهمترین ارگان هاست که در بالا و سمت راست شکم و زیر قفسه سینه قرار گرفته است. این اندام عملکردهای مختلفی دارد که برای حیات ضروری هستند.

نمونه برداری سوزنی از کبد به چه شکل انجام میشود؟

نمونه برداری از کبد در بعضی از بیماری های کبدی، برای بررسی بیشتر وضعیت کبد و کمک به درمان بهتر، لازم است و نمونه کوچکی از بافت کبد تهیه شده و مطالعه آن در زیر میکروسکوپ توسط پزشک آسیب شناسی انجام می شود. در این روش جزئیات کاملتری از وضعیت سلامت کبد نسبت به سونوگرافی یا سایر آزمایشات و تصویر برداری ها حاصل میشود و از شدت و میزان پیشرفت بیماری کبدی نیز آگاه میشویم.

-ممکن است عبور دادن سوزن و نمونه برداری یک بار دیگر تکرار شود تا نمونه کافی بدست آید. سپس محل نمونه برداری پانسمان می شود. نیازی به بخیه کردن محل ورود سوزن نیست. نمونه کبد بدست آمده در شیشه حاوی محلول مخصوص (فرمالین) قرار داد شده و به آزمایشگاه ارسال می شود.

عوارض احتمالی:

بیوپسی کبد هنگامی که توسط پزشک با تجربه انجام شود یک عمل بی خطر است. عارضه شایع نمونه برداری از کبد، احساس درد در محل ورود سوزن و سمت راست شکم و یا شانه راست است. این احساس درد معمولاً مبهم و خفیف است، با نفس کشیدن قدری بیشتر می شود و اغلب ظرف چند ساعت تا یک روز از بین میرود. برای کاهش درد میتوانید با تجویز پزشک از مسکن خوراکی مانند استامینوفن استفاده کنید.

آمادگی های قبل از نمونه برداری یا بیوپسی:

1- داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین، پلاویکس و وارفارین از چند روز قبل از عمل با هماهنگی پزشک قطع شود.

2- به مدت 6 تا 8 ساعت ناشتا باشید، شب قبل از مراجعه حمام بروید و موهای ناحیه فوقانی شکم و زیر دنده ها سمت است شکم تمیز و زودوده شود.

3- تمامی مدارک پزشکی و آزمایشات درخواستی را همراه داشته باشید.