



علائم خطر جهت مراجعه به پزشک چیست؟

در صورت بروز ناگهانی

➤ درد قفسه سینه

➤ گیجی

➤ صدای غیر عادی در گوش

➤ اختلال بینایی

➤ تغییر شنوایی

باید مصرف دارو فوراً قطع و به پزشک مراجعه شود.

عوارض جانبی:

سردرد، تپش قلب، گرگرفتگی، سرگیجه،
تشنج فراموشی موقتی، افزایش فشار
خون، کهیر کمردرد، درد عضلانی،
سوهاضمه، احتقان بینی عفونت ادراری،
تاری دید، تغییرات در دید رنگی اسهال،
خارش، نعوظ پایدار و غیر طبیعی کاهش
شنوایی



داروی تادالافیل

مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۳۲۲۶۴۸۲۵-۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار

کد: PE/URO -KH-01-10

این برگه شامل نکاتی در مورد آشنایی با داروی تادالافیل می باشد. لطفا این مطالب را با دقت مطالعه بفرمایید. امیدواریم با رعایت این نکات سلامتی خود را باز یابید.

چه زمانی تادالافیل تجویز می شود؟

- درمان اختلالات نعوظ
- درمان زیادی فشار خون شریان ریوی
- بزرگی خوش خیم پروستات

تادالافیل را چگونه باید مصرف کنید؟

■ تادالافیل را می توانید قبل یا بعد از غذا مصرف نمایید. برای درمان اختلال عملکرد جنسی این دارو را قبل از فعالیت جنسی مصرف کنید. بیشتر از یکبار در روز مصرف نکنید. برای درمان فشار خون ریوی دارو را با یا بدون وعده غذایی مصرف کنید.



تادالافیل با کدام داروها و غذا ها تداخل دارد؟

■ مصرف این دارو با ایتراکونازول، کتوکونازول و ریتوناویر باعث افزایش سطوح تادالافیل میشود.

■ مصرف این دارو با الکل، آملودیپین، انالاپرل باعث افت فشار خون میشود.

■ اثر دارو با مصرف گریپ فروت افزایش می یابد.

مصرف همزمان با نیتروگلیسرین به دلیل افت فشارخون ممنوع است.

