

تومور مثانه (TURBT)

مرکز آموزشی درمانی آیت الکاظمی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۲۵۴۸۲۵-۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار


کد PE/ONCO -KH-01-24

عواقب مورد انتظار:

درمان تومور مثانه زمانی که زود تشخیص داده شود اغلب موفقیت آمیز است اما عود آن شایع می باشد بنابراین بررسی های منظم بعد از درمان توصیه می شود.

عوارض احتمالی:

عفونت در مثانه یا کلیه ها علائم در این حالت کمردرد - تب و استفراغ - انسداد ادراری می باشد.



درمان:

- درمان توسط جراحی برداشتن تومور (TURBT) می باشد.
- برداشتن مثانه و تغییر مسیر ادراری
- رادیوتراپی (اشعه درمانی)
- کموتراپی
- پس از جراحی یا سایر روش های درمانی وبا موافقت پزشک بیمار فعالیت های عادی خود را از سر می گیرد (از جمله فعالیت جنسی) هیچ رژیم خاصی توصیه نمیشود.



عوامل افزایش دهنده خطر:

- کشیدن سیگار
- سابقه خانوادگی تومور مثانه
- مواجهه با آمین ها (رنگ های حاوی آنیلین) یا مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت لاستیک

علامین شایع

- در مراحل اولیه معمولا همچوری میکروسکوپی (مشاهده خون در آزمایش ادرار) دیده می شود.
- وجود خون در ادرار
- سوزش ادرار
- درد در ناحیه لگنی
- تعداد دفعات ادرار زیاد می شود اما در هر بار حجم ادرار کم است.
- کاهش وزن بدون توجیه


تومور مثانه:

تومور مثانه عبارت است از رشد یک بافت غیر طبیعی در مثانه که در آن تقسیم سلولها به طور سریع و غیر قابل کنترل انجام می گیرد. تومور ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشد. تومورهای مثانه در افراد بالای 50 سال شایع تر است و ضمنا شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است.



علل:

ناشناخته می باشد در برخی موارد حدس زده میشود که مواجهه با عوامل سرطان زایی محیطی عامل ایجاد تومور می باشد.



تشخیص:

برای تایید تشخیص تومور از آزمایش ادرار - عکسبرداری از مثانه و مجاری ادراری و سیستوسکوپی (بررسی داخل مثانه با کمک سیستوسکوپ)

