



پری‌توینیت

مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۳۲۲۶۴۸۲۵-۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار

کد: PE/IN -KH-01-50

در صورتی که بیماری شما به دنبال انجام دیالیز صفاقی ایجاد شده است لازم است نکات زیر را در انجام هر بار رعایت رعایت فرمایید:

* شستشوی دستها را به روش صحیح، قبل از دست زدن به کاتتر دیالیز انجام دهید.

* پوست اطراف کاتتر دیالیز خود را با یک محلول ضدعفونی کننده مثل بتادین به صورت روزانه تمیز کنید.

* وسایل دیالیز صفاقی را در محلی که ضدعفونی شده است نگهداری کنید.

* از ماسک در طی انجام دیالیز و تعویض مایعات استفاده کنید.

نکات خودمراقبتی بعد از عمل:

* بعد از عمل تا زمانی که پزشک دستور بدهد باید ناشتا بمانید.

* در زمانی که ناشتا هستید، مایعات دریافتی مورد نیاز بدن شما به صورت سرم برایتان تامین خواهد شد.

* بعد از شروع رژیم ابتدا مایعات شامل ویتامین مصرف کنید و در صورت تحمل، رژیم معمولی برای شما شروع میشود.

* به هیچ وجه از نوشیدنی های صنعتی بعد از اتمام زمان ناشتایی استفاده نکنید.

* غذاهای پرفیبر و پر پروتئین شامل گوشت و سبزیجات در بهبود شما کمکننده میباشد.

* پس از درمان، تا برطرف شدن علائم در بستر استراحت نمایید و به تدریج انجام فعالیت های طبیعی خود را از سر بگیرید.

* داروها و آنتی بیوتیک های خود را به طور منظم جهت پیشگیری از عفونت مصرف کنید.


* در صورت وجود درد در محل عمل، میتوانید طبق نظر پزشک از مسکن استفاده کنید.

* بعد از ترخیص در صورت تشدید درد غیر قابل کنترل ، وجود ترشحات در محل برش جراحی و یا وجود تب بالای ۳۸ درجه به پزشک خود مراجعه کنید.

پریتونیت چیست؟

به التهاب پرده پوشانده ارگان ها و دیواره داخلی شکم پریتونیت اطلاق می شود.

این التهاب میتواند به صورت عارضه بعضی بیماری ها مثل بیماری های کبدی، بیماری های کلیوی و یا به دنبال پاره شدن روده، صدمات وارد شده به شکم، عمل جراحی قبلی و یا سایر بیماری های گوارشی ایجاد شود. افرادی که دیالیز صفاقی انجام میدهند در معرض خطر عفونت شکم هستند.



بیماری پریتونیت چه علائمی دارد؟

*عدم دفع گاز و یا عدم اجابت مزاج

*احساس پری در شکم

*احساس تشنگی

*تهوع و استفراغ

*کاهش اشتها

*کاهش ادرار

*درد شکم

*اسهال

*خستگی

*گیجی

*تب در افرادی که از دیالیز صفاقی استفاده میکنند کدورت مایع دیالیز و یا بسته شدن مسیر لوله با رسوبات سفید میتواند مطرح کننده بیماری باشد.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟

در صورت وجود درد شدید، باد کردن شکم و یا حس پری در شکم باید سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کنید.



تشخیص و درمان پریتونیت:

پزشک با معاینه، عکس رادیولوژی، سی تی اسکن و آزمایشات خون و ادرار بیماری شما را تشخیص میدهد.

این بیماری نیاز به اقدامات سریع درمانی دارد، در صورت عدم درمان و یا استفاده از درمانهای خانگی برای رفع علائم، بیماری پیشرفت کرده و عفونت وارد خون میشود و عواقب غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. پزشک با توجه به علت ایجاد کننده بیماری تصمیم به جراحی میگیرد. ادامه درمان بصورت دریافت مایعات وریدی و آنتی بیوتیک میباشد.

